

تب مالت

تعریف بالینی :

در بیمار با تب و تعریق و کاهش وزن و درد مفاصل و کاهش اشتها که اپیدمیولوژی مثبت از نظر تماس با دام و مصرف محصولات لبنی دارد، در مناطق آندمیک مثل ایران ، یکی از مهمترین تشخیص های افتراقی بروسلوز می باشد .

تشخیص :

ارسال آزمایشات Wright , Coombs wright , 2we می باشد

که بر اساس پروتکل کشوری $wright \geq 1/80$, $2ME \geq 1/40$ به همراه علائم بالینی ، تشخیص بروسلوز مطرح می باشد.

درمان :

یکی از روشهای زیر است:

روش اول : کپسول داکسی سایکلین 100mg هر ۱۲ ساعت حداقل ۶ هفته + کپسول ریفاپین 300mg هر ۱۲ ساعت حداقل ۶ هفته

روش دوم : کپسول داکسی سایکلین 100mg هر ۱۲ ساعت حداقل ۶ هفته + آمپول جنتامایسین 5mg/kg روزانه به مدت یک هفته عضلانی یا وریدی

پیگیری و درمان :

فقط بر اساس بهبودی علائم بالینی (قطع تب ، افزایش اشتها ، افزایش وزن و...)

نیاز ارجاع به متخصص:

- درموردی که به درمان پاسخ مناسب داده نشود
- درمورد لوکالیزه مانند اسپوندیلودیسکادیتس
- درگیری CNS و درگیری قلب و ...
- خانمهای باردار و شیرده
- افرادی که دچار عوارض دارویی مانند افزایش آنزیم های کبدی ، افزایش کراتنین ناشی از جنتامایسین – عدم تحمل داکسی سایکلین و ... شده اند.

