

روکرده تشخیصی و درمانی

به مسمومیت‌ها

تابستان ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه:

دکتر شاهین شادنیا، استاد - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، رئیس مجموعه بخش‌های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر باک مصطفی زاده، استاد - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، مدیر گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر میرزا رحیمی، دانشیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، معاون پژوهشی گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر پیمان عرفان طلب اوینی، استادیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، معاون آموزشی گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر لیدا شجاعی آرانی، استادیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر حروش فرجی دانا، استادیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر گامبیز سلطانی نژاد، دانشیار - متخصص سم شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی

دکتر حسن امیری، دانشیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر بینا دادپور، دانشیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، مدیر گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علیرضا قاسمی طوسی، استادیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکtor علی استادی، دانشیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، رئیس بخش مسمومین بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر محمد مجیدی، دانشیار - فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، مدیر گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مشاور: دکtor ساناز بخشندۀ رئیس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظرات فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعریفه سلامت

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

رویکرد تشخیصی و درمانی به مسمومیت‌ها

Diagnostic and therapeutic approach to intoxications

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

مواجهه عمده یا اتفاقی فرد با انواع دارو و سم به صورت مسمومیت‌های حاد و مزمن، سوء مصرف انواع مواد مخدر و محرك، گرش حیوانات سمی و غیر سمی (مارگزیدگی، عقرب گزیدگی، زنبورگزیدگی، گرش عنکبوت‌ها...)، مسمومیت‌های گیاهی و گازی ... از علل موارد مراجعه یا ارجاع بیماران به مراکز درمانی می‌باشد.

نظر به ماهیت بالقوه کشندۀ بعضی از محصولات دارویی و سموم و مصدومیت و مرگ ناشی از گرش‌ها، انجام به موقع و سریع اقدامات تشخیصی - درمانی با در نظر گرفتن زمان طلایبی تشخیص و درمان مسمومیت‌ها، نقش به سزاپی در کنترل شرایط بالینی، درمان موقیت آمیز و کاهش ناتوانی و مرگ و میر بیماران ایفا می‌کند. بنابراین وجود استاندارد خدمتی که بتواند نسبت به مدیریت درمانی - مراقبتی این بیماران مبتنی بر شواهد علمی (Evidence – Based Principles)، راهگشا باشد لازم به نظر می‌رسد. با توجه به اهمیت رسیدگی سریع به بیماران دچار انواع مسمومیت، در برخی کشورها سامانه یکپارچه جهت مدیریت این بیماران در قالب مرکز کنترل مسمومیت‌ها (Poison Control Center) در نظر گرفته شده است.

ج) اقدامات یا پروسه‌های ضروری جهت درمان بیماری:

درمان بیماران دچار مسمومیت‌های حاد و Overdose جزء موارد درمان‌های اورژانس محسوب می‌گردد، که با توجه به شرح حال (مبنی بر نوع ماده مصرفی، مقدار و زمان مصرف)، و شرایط بالینی اولیه (مجموعه‌ای از تظاهرات بالینی با وضعیت پایدار و هوشیاری کامل بیمار تا کاهش سطح هوشیاری و وضعیت ناپایدار ... و شوک)، اقدامات تشخیصی و درمانی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

- ارزیابی راه هوایی (Airway) و درصورت لزوم انجام انتوباسیون
- ارزیابی تنفس بیمار (Breathing)
- ارزیابی گردش خون و پر فیوژن بافتی (Circulation & Perfusion) و درصورت لزوم تعییه رگ مرکزی
- ارزیابی وضعیت هوشیاری (Mental Status)
- ارزیابی بالینی (Clinical Evaluation) و بررسی سندروم‌های توکسیک (Toxicdrome)
- بررسی‌های تشخیصی (Diagnostic Investigation)
- جلوگیری از جذب بیشتر سم یا دارو (Prevention of Absorption) و شستشوی کامل روده‌ای (Irrigation Whole Bowel)
- آنتی‌دوت تراپی

- افزایش دفع سموم یا داروهای جذب شده (Enhance Elimination) و درصورت لزوم تعییه شالدون برای انجام روش‌های اکسٹراکوپورال
- ارزیابی مجدد و تعیین تکلیف بیمار

د) ارزیابی قبل، حین و بعد از انجام خدمت تشخیص و درمان مسمومیت‌ها

ابتدا پوزیشن مناسب برای سر و گردن، بررسی ستون فقرات گردنی جهت رد ترومما، تمیز کردن راه هوایی و ساکشن ترشحات و بررسی رفلکس gag و سرفه انجام می‌گیرد. با توجه به ارزیابی بالینی و درصورت مناسب نبودن راه هوایی، اقدامات لازم جهت برقراری راه هوایی مناسب و درصورت نیاز انتوپاسیون انجام می‌گیرد.

سپس با پالس اکسیمتری و بررسی گازهای خونی (ABG1 & VBG2) جهت ارزیابی اکسیژن‌اسیون و تهophage تنفسی O₂ Saturation (Oxygenation & Ventilation)، با توجه به وضعیت بالینی و عدم کفايت اکسیژن رسانی بافتی و یا RSI4 و انجام تهophage مکانیکی کمتر از ۹۲٪، از اکسیژن کمکی (نازال کانولا و یا ماسک ساده)، BVM3، انتوپاسیون به روش استفاده می‌شود.

چک علام حیاتی و مانیتورینگ قلبی، نوار قلب ۱۲ لید، برقراری راه وریدی محیطی یا مرکزی، انجام و با توجه به ارزیابی بالینی و درصورت عدم پرفیوژن بافتی مناسب و اختلال گردنش خون، انفوژیون مایع کافی (Fluid resuscitation) برای بیمار به منظور حفظ بروند ادراری مناسب صورت می‌گیرد. احیا قلبی - ریوی (CPR5)، درمان آنتی دیس‌ریتمی (مثل تجویز آتروپین در موارد برادیکاردی، بیکربنات سدیم در موارد QRS Widening و استفاده از اینوتروپ و وازوپرسور در موارد افت پیشرونده فشار خون، از دیگر اقداماتی است که درصورت نیاز انجام می‌گیرد.

در موارد کاهش سطح هوشیاری، چک قند خون صورت گرفته و درصورت نیاز دکستروز، نالوکسان و تیامین تجویز می‌شود. چک درجه حرارت بدن ترجیحاً از طریق داخل گوش و یا رکنوم انجام و در هیپرترمی (درجه حرارت بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد) از تجویز داروهای آرامبخش، cooling، انتوپاسیون، داروهای فلچ کننده عصبی - عضلانی، آنتی دوت‌های مرتبط با نوع مسمومیت مثل دانترولن سدیم و یا برومکریپتین و یا سیپروهپتادین استفاده می‌شود. در هیپوترمی (درجه حرارت کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد) گرم کردن (rewarming) انجام می‌شود.

درصورت تشنج برای کنترل تشنج از بنزو دیازپین، پریدوکسین، باربیتورات‌ها، والپروات سدیم، لووتیراستام و پروپوفل استفاده می‌شود. برای کنترل بیفاراری بنزو دیازپین‌ها، آنتی سایکوتیک‌ها و یا سایر داروهای سداتیو - هیپنوتیک تجویز می‌شود.

در بررسی‌های پاراکلینیک نمونه خون جهت آنالیز گازهای خون (VBG or ABG)، الکترولیت‌های سرم، لاكتات، CBC6، Cr8، BUN7، CKmb15، CPK14، Troponine Test خصوصاً برای تجسس مواد مخدر و محرك انجام می‌شود. بررسی سطح خونی داروها و سموم جهت بررسی سطح کمی داروها و تعیین نیاز به مداخلات درمانی جهت رفع مسمومیت از جمله تجویز آنتی دوت، نیاز به ادامه آنتی دوت و یا قطع آن و نیز استفاده از روش‌های اکسٹراکوپورال مثل همودیالیز و یا هموپرفیوژن درخصوص مسمومیت‌هایی مثل

استامینوفن، لیتیم، سالیسیلات، کاربامازپین، والپروات سدیم و و بررسی میزان فعالیت آنزیم کولین استراز در سرم و یا گلبول های قرمز در موارد مسمومیت با سموم ارگانوفسفره انجام می شود.

بررسی های تصویربرداری از جمله گرافی ساده شکم جهت ارزیابی موارد مسمومیت با دارو و سموم رادیواپک مثل مسمومیت با انواع فلزات (آهن، جیوه، سرب..) و فسفید روی و و انجام CT اسکن مغز در موارد کاهش سطح هوشیاری اولیه یا پیشرونده جهت بررسی احتمال Head Trauma و بررسی علایم نورولوژیک به علت عوارض ناشی از مسمومیت و گاهی از MRI مغز استفاده می شود. انجام CT اسکن شکم و لگن برای تشخیص و پیگیری درمان بیماران بادی پکر و بادی استافر ضرورت دارد. در سیر درمان بیماران مسمومیت با ارگانوفسفره نیاز به انجام EMG16 و NCV17 می باشد. در مسمومیت با برخی سموم که عوارض ریوی دارند از جمله پاراکوات نیاز به انجام اسپیرومتری می باشد.

باتوجه به نوع مواجهه با سم یا دارو (از راه پوست، تنفس، گوارش و چشم) آلدگی زدایی انجام می شود. در مواجهه استنشاقی مثل مواجهه با گازهای صنعتی، بیولوژیک، مواد شوینده و بهداشتی خانگی مثل گازهای متصاعد شده از ترکیب اسید و مواد پاک کننده دریافت اکسیژن کمکی و تجویز آنتی هیستامین و کورتیکو استروئید در درمان اولیه کمک کننده می باشند. در آلدگی زدایی پوستی مثلا در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره، خارج کردن البسه بیمار و شستشوی فراوان با آب و صابون ضروری می باشد. حفاظت فردی پرسنل جهت پیشگیری از انتقال آلدگی و استفاده از وسایل محافظتی لازم هست. در موارد آلدگی زدایی چشم با انواع سموم و داروهای مایع، باید شستشوی فراوان با آب ولرم و یا نرمال سالینحداقل به مدت ۳۰ دقیقه صورت گیرد. در موارد مسمومیت های گوارشی، تخلیه محتویات معده از طریق لاواز اروگاستریک (Orogastric Lavage) و یا نازوگاستریک (Nasogastric Lavage) توصیه می شود. برای محدود کردن جذب داروها و سموم در صورت لزوم، یک دوز زغال فعال شده (شارکول) با دوز 1 gr/Kg تجویز می شود. با شستشوی کامل دستگاه گوارش (WBI18) با PEG19 در مصرف داروهای آهسته رهش و موارد Foreign Body لازم هست.

در آنتی دوت تراپی باتوجه به نوع مسمومیت، شدت مسمومیت و زمان مصرف دارو و یا سم، آنتی دوت های اختصاصی تجویز می شود (طبق آخرین شناسنامه و استاندارد خدمت آنتی دوت تراپی در مسمومیت های حاد و مزمن) برای افراش دفع سموم یا داروهای جذب شده (Enhance Elimination)، دیالیز روده ای با تجویز سریال دوز زغال فعال شده (MDAC20) با دوز 0.5 g/kg هر ۶ ساعت برای ۲۴ ساعت و یا ۴ دوز استفاده می شود. قلیایی کردن خون و یا ادرار در برخی مسمومیت ها توصیه می شود.

از روش های اکستراکوپورال از جمله همو دیالیز در مسمومیت با انواع الکل های سمی (متانول، اتیلن گلیکول)، پاراکوات، لیتیوم، کاربامازپین، سالیسیلات، والپروات سدیم، استامینوفن با سطوح سرمی بالا، و از همو پرفیوژن در برخی مسمومیت ها مثل فنوباریتال، تئوفیلین، باکلوفن و و از پلاسمافرز در برخی گرش ها از جمله عقرب های گادیم و از تعویض خون در موارد متهما گلو بینمی شدید، همولیز شدید، مسمومیت شدید سالیسیلات در شیرخواران و نوزادان استفاده می شود. بایستی شالدون جهت استفاده از روش اکستراکوپورال تعییه شود.

در برخی بیماران جهت حفظ راه هوایی مطمئن نیاز به تراکثوستومی پرکوتانشوس و در برخی بیماران جهت کنترل و درمان عوارض ریوی نیاز به انجام برونکوسکوپی در بالین می باشد.

در ارزیابی مجدد و تعیین تکلیف بیمار (Determine Disposition) قضاوت بالینی پزشک درخصوص وضعیت بالینی بیمار، نوع سم و یا دارو مصرف شده، عوارض همراه با مسمومیت، نوع مواجهه با ماده مصرفی و توجه به علت مسمومیت (عمدی، اتفاقی) می‌تواند در تعیین نیاز بیمار به مراقبت‌های درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه و یا بستری در بخش و یا ارجاع به روانپزشک تعیین کننده باشد.

۵) تواتر ارایه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز / فواصل انجام)

همانطور که در قسمت‌های بالا ذکر شد، بیماران مسموم شرایط بحرانی دارند و به مراقبت دقیق، فوری و لحظه‌ای نیاز دارند و حضور پزشک درمانگر بصورت مداوم در بالین بیمار ضرورت دارد.

تعیین تواتر ارایه خدمت در مسمومیت‌ها بسیار سخت است، اما اگر بخواهیم تواتر ارایه خدمت را تعیین بکنیم بایستی به چند نکته از جمله وضعیت بالینی بیمار، نوع سم و یا دارو مصرف شده، عوارض همراه با مسمومیت، نوع مواجهه با ماده مصرفی، سوابق پزشکی بیمار، و به علت مسمومیت (عمدی، اتفاقی) توجه داشته باشیم و طبقه‌بندی مسمومیت شدید و کشنده، متوسط و خفیف را انجام بدهیم (طبق جدول). مسمومیت با برخی ترکیبات مانند قرص برنج (فسفید آلومینیوم)، دیگوگسین، سیانید، داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای و ... کشنده است. مسمومیت با برخی ترکیبات مانند مواد اوپیوئیدی، مواد محرك، داروهای ضدتشنج، استامینوفن و ... متوسط و مسمومیت با برخی ترکیبات مانند بنزو دیازپین‌ها خفیف هستند، اما این فقط با توجه به نوع ماده مصرفی است و سایر فاکتورهای مرتبط در تعیین شدت مسمومیت در نظر گرفته نشده است. در مسمومیت‌های کشنده حضور مداوم در طی ۲۴ ساعت اول و ویزیت‌های مکرر و لحظه‌ای جهت حفظ و نجات حیات بیمار ضرورت دارد. در مسمومیت‌های متوسط ویزیت حداقل هر ۴ ساعت یکبار و در مسمومیت‌های خفیف ویزیت هر ۱۲ ساعت یکبار ضرورت دارد.

در هر بار ویزیت، بایستی به وضعیت راه هوایی (Airway) و ضرورت انتوباسیون، وضعیت تنفس بیمار (Breathing) و ضرورت حمایت تنفسی و استفاده از تهییه مکانیکی، وضعیت گردش خون و پرفیوژن بافتی (Circulation & Perfusion) و ضرورت تعییه رگ مرکزی، وضعیت هوشیاری (Mental Status)، اقدامات لازم جهت جلوگیری از جذب بیشتر سم یا دارو (Whole Bowel Irrigation) و ضرورت انجام شستشوی کامل روده‌ای (Prevention of Absorption)، آنتی دوت تراپی، افزایش دفع سmomom با داروهای جذب شده (Enhance Elimination) و تعییه شالدون برای انجام روش‌های اکستراکوپورال صورت گیرد.

خفیف	متوسط	شدید و کشنده
<ul style="list-style-type: none"> • بیمار مسموم با ضعف و بی حالی ولی با هوشیاری کامل و همودینامیک پایدار • بیمار مسموم با هوشیاری کامل و نیازمند به آلدگی زدایی 	<ul style="list-style-type: none"> • وجود کاهش سطح هوشیاری GCS کمتر از ۱۵ و بیشتر از ۱۲) • بروز عوارض مسمومیت بدون نیاز به مداخلات درمانی اختصاصی مانند: ○ نارسایی کلیه بدنبال مسمومیت بدون نیاز به 	<ul style="list-style-type: none"> • نیاز به انتوباسیون و تهییه کمکی • نیاز به آنتی دوت تراپی از جمله تجویز ان استیل سیستین، آتروپین، فلومازنیل، نالوکسان، پرالیدوکسیم، گلوکاگون، کلسیم، انسولین گلوکز، بیکربنات سدیم، ویتامین K

<p>دستگاه گوارش از طریق تخلیه محتویات معده</p> <ul style="list-style-type: none"> • بیمار مسموم با هوشیاری کامل و نیازمند به آلودگی زدایی دستگاه گوارش از طریق تجویز شارکول 	<p>همودیالیز، همودیالیز، همودیالیز</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ رابدومیولیز بدنبال مسمومیت بدون نیاز به همودیالیز ○ دیسترس تنفسی بدنبال مسمومیت بدون نیاز به تهویه مکانیکی ○ تاکیکاردی سینوسی بدنبال مسمومیت ولی با همودینامیک پایدار و بدون نیاز به مداخلات درمانی اختصاصی • مسمومیت با سموم و داروهای دارای آنتی دوت که نیاز به آنتی دوت تراپی وجود ندارد و صرفا درمان عالمتی - حمایتی و مانیتورینگ بیمار انجام می شود. • آریتاسیون و بی قراری بدنبال مسمومیت بدون نیاز به مداخله درمانی و صرفا اقدامات مراقبتی و مانیتورینگ بیمار انجام می شود. • بیمار مسموم نیازمند به مانیتورینگ قلبی - تنفسی • بیمار مسموم نیازمند به MDAC • بیمار مسموم نیازمند به تحویز WBI • وجود هیپوترمی و یا هیپرترمی بدون نیاز به درمان اختصاصی • وجود اختلالات الکترولیتی و متابولیکی نیازمند به درمان • نیاز به استفاده از روش های اکستراکورپورال (از جمله همودیالیز، هموپر فیوژن، CRRT، پلاسمافرژیس) • بیماران بادی پکر و بادی استافر 	<p>دکستروز هیپرتونیک، کلرید سدیم هیپرتونیک، ال کاربینیک، ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • نیاز به آنتی ونوم تراپی (تجویز سرم ضد سم مار یا سرم ضد سم عقرب) • نیاز به تجویز شلاتور • نیاز به درمان با داروهای ضدتشنج GCS21 • وجود کاهش سطح هوشیاری (۱۲ و یا کمتر از آن) • وجود دیس ریتمی قلبی و یا تغییرات ST-T در نوار قلب نیاز به مداخله درمانی • همودینامیک نایپایدار (فشار خون سیستولیک کمتر از ۹۰ mmHg و یا تعداد ضربان قلب کمتر از ۵۰ beat/min)، شوک کاردیوژنیک و یا هیپولومیک نیازمند به تجویز داروهای واژوپرسور و یا اینوتروپ • وجود هیپوترمی و یا هیپرترمی نیازمند به درمان اختصاصی • وجود اختلالات الکترولیتی و متابولیکی نیازمند به درمان • نیاز به استفاده از روش های اکستراکورپورال (از جمله همودیالیز، هموپر فیوژن، CRRT، پلاسمافرژیس) • بیماران بادی پکر و بادی استافر
--	--	---

(و) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) / خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

به ترتیب اولویت

- 1- فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها و دستیاران فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
- 2- متخصص طب اورژانس (صرفا جهت ارایه خدمات در اورژانس)، پزشکی قانونی، داخلی، دکترای تخصصی سم شناسی با پایه M.D. و اطفال (صرفا جهت بیماران اطفال) براساس کوریکولوم رشته تخصصی مربوطه

ز) افراد صاحب صلاحیت جهت ارایه خدمت مربوطه:

به ترتیب اولویت

۱- فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها و دستیاران فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

۲- متخصص طب اورژانس (صرف اجهت ارایه خدمات در اورژانس)، پزشکی قانونی، داخلی، دکترای تخصصی سم شناسی با پایه M.D و اطفال (صرف اجهت بیماران اطفال) براساس کوریکولوم رشته تخصصی مربوطه. متخصص های مذکور باید حداقل یک ماه دوره آموزشی در بخش های مسمومین رو به تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل سپری کرده باشند.

ح) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضاي تیم ارایه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارایه خدمت
۱	پرستار	حداقل کارشناسی	مدرک کارشناسی پرستاری و به بالاتر و ترجیحاً دارای گواهی دوره آشنایی با مراقبت های سم شناسی بالینی و مسمومیت ها	پرستار

ط) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارایه خدمت:

در بخش سم شناسی بالینی و مسمومیت ها (بخش اورژانس، و بخش های بستری اعم از بخش های عادی و مراقبت های ویژه)، ارایه خدمت صرفاً توسط افراد صاحب صلاحیت (مندرج در بنده ز) صورت می گیرد.

ی) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

- یک تخت به ازای هر بیمار
- مانیتورینگ قلبی
- پالس اکسی متری
- لارنگوسکوپ و لوله تراشه در سایزهای مختلف
- تراالی داروهای کد احیاء قلبی - ریوی
- دستگاه الکتروشوک
- دستگاه الکتروکاردیوگرافی
- پمپ و یا سرنگ انفوژیون به ازای هر آنتی دوت تجویزی یک عدد
- دستگاه همودیالیز جهت انجام همودیالیز و یا هموپریوژن

ک) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارایه هر خدمت:

- آنتی دوت های مربوطه

- داروهای مورد استفاده در ترالی کد احیاء قلبی - ریوی
- سرنگ، سرم، سست سرم، آب مقطر
- دستکش یکبار مصرف
- کارتريج مربوطه برای انجام هموپر فیوژن

(ل) استانداردهای ثبت :

در کلیه مراحل تشخیص و درمان از جمله معاینه اولیه، تجویز آنتی دوت، علایم و نشانه ها، بررسی پاسخ ها به درمان و نیاز به تجویز مجدد آنتی دوت، نیاز به انجام روش های اکسٹراکپورال ، نیاز به تعییه رگ مرکزی و شالدون، دیالیز روده ای، تجویز شارکول، انجام گازهای خونی، اقدامات احیاء، تراکتوستومی و ... باید ثبت شوند. در صورت بروز عوارض ناشی از آنتی دوت یا تداخلات دارویی با آن، این موارد نیز باید ذکر شوند.

(م) انديکاسيون های دقیق جهت تجویز خدمت :

اندیکاسیون دقیق هر اقدام تشخیصی و درمانی از جمله تجویز هر یک از آنتی دوت ها، تجویز شارکول، دیالیز روده ای، روش های اکسٹراکورپوئال و ... در منابع علمی سم شناسی بالینی و مسمومیت ها ذکر شده است.

(س) شواهد علمی در خصوص کنترالاندیکاسیون های دقیق خدمت :

کنترالاندیکاسیون دقیق هر اقدام تشخیصی و درمانی از جمله تجویز هر یک از آنتی دوت ها، تجویز شارکول، دیالیز روده ای، روش های اکسٹراکورپوئال و ... در منابع علمی سم شناسی بالینی و مسمومیت ها ذکر شده است.

(ع) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارایه هر بار خدمت مربوطه :

مدت زمان ارایه این خدمت با در نظر گرفتن نوع مسمومیت و شدت آن متغیر خواهد بود. به طور متوسط این زمان ۱-۴ روز تخمین زده می شود. اما در بیماران دچار عوارض مسمومیت ها از جمله عوارض ریوی، کلیوی و مغزی ممکن است براساس پاسخ بیمار و سیر عوارض مسمومیت، طول مدت درمان طولانی تر شود.

(ن) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار (موارد آموزشی که باید به بیمار، و همراه بیمار به صورت شفاهی، کتبی در قالب فرم آموزش به بیمار، پمپلت آموزشی، CD و ... آموزش داده شود تا روند درمان را تسريع نموده و از عوارش ناشی از درمان جلوگیری نماید):

در حین و شروع درمان درخصوص نوع مسمومیت و شدت و عوارض آن و همچنین اقدامات درمانی مطرح برای بیمار، به بستگان درجه یک توضیحات ارایه شود و بعد از ترخیص توصیه های درمانی لازم جهت بهبود عوارض و همچنین اقدامات پیشگیرانه از مواجهه مجدد ارایه شود.

اختصارات بکار رفته در متن

1. Arterial Blood Gas
2. Venous Blood Gas
3. Bag-Valve-Mask
4. Rapid Sequence Intubation
5. Cardio-Pulmonary Resuscitation
6. Cell Blood Count
7. Blood Urea Nitrogen
8. Creatinine
9. Prothrombin time
10. Partial Thromboplastin Time
11. International Normalised Ratio
12. Aspartate Transaminase
13. Alanine Transaminase
14. Creatine kinase
15. Creatine kinase-MB
16. Electromyography
17. Nerve conduction velocity
18. Whole Bowel Irrigation
19. Polyethylene Glycol
20. Multiple Dose Activated Charcoal
21. Glasgow Coma Scale

منابع:

- 1- Hoffman RS, Nelson LC, Goldfrank LR, Howland MA, Lewin NA, Smith SW. Goldfrank's toxicologic emergencies. 11th Ed. New York: McGraw-Hill Education; 2019.
<https://books.google.com/books?id=a6QwswEACAAJ&dq>
- 2- Shannon MW, Borron SW, Burns MJ. Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose. Philadelphia, PA: Saunders; 2007.
- 3- <https://www.medscape.com>
- 4- <https://www.uptodate.com>
- 5- <https://www.clintox.org/resources/clinical-toxicology>

۶- آخرین ویرایش شناسنامه و استاندارد خدمت آنتی دوت تراپی در موارد مسمومیت های حاد و مزمن.