

PPROM تعریف:

پارگی غشاء قبل از زایمان (PROM) به پارگی غشاء قبل از شروع انقباضات رحمی اشاره دارد (Preterm PROM (PPROM). به PROM قبل از هفته 37+0 بارداری اشاره دارد. تقریباً یک سوم زایمان‌های زودرس را مسئول یا مرتبط با آن است و شایع‌ترین عامل قابل شناسایی مرتبط با زایمان زودرس است.

تشخیص:

– معاینه بالینی واژینال با اسپکولوم استریل و رویت gush مایع شفاف

– تست فرن

– تست نیتراژین

– تست آمنیوشور

– بررسی AFI با سونوگرافی

مدیریت عوارض:

- تشخیص کوریوآمینونیوت (کنترل علائم حیاتی مادر و بررسی FHR جنین

مدیریت حاملگی های پیچیده شده توسط PPRM بر اساس در نظر گرفتن چندین عامل است که ارزیابی می شوند:

● سن حاملگی

● وجود یا عدم وجود عفونت مادر/جنین

● وجود یا عدم وجود علائم زایمان

● نمایش (پرزانتاسیون) جنین

● سلامت جنین

● بلوغ ریه جنین بر اساس سن حاملگی

● وضعیت دهانه رحم (با معاینه چشمی)

● در دسترس بودن سطح مناسب مراقبت از نوزادان

– سن بالای ۳۴ هفته:

-شروع آنتی بیوتیک آمپی سیلین ۲ گرم هر ۶ ساعت

-آزیترومایسین ۱ گرم stat

-اقدام برای زایمان

در صورت سن ۲۳ تا ۳۳+۶ هفتگی : دریافت کورتون ، توکولیتیک، آنتی بیوتیک، پروفیلاکسی GBS

(در صورت سن کمتر از ۳۲ هفته نیز سولفات منیزیم نوروپروتکتیو)

– سن کمتر از ۲۳ هفته : شروع آنتی بیوتیک و مشاوره با والدین جهت ختم بارداری بعلم عوارض شدید پره ناتال

نکته: در صورت حساسیت به پنی سیلین، داروی آلترناتیو جایگزین گردد

در صورت احتمال زایمان زیر ۳۷ هفته، در صورت Stable بودن مادر و جنین ، مادر باید به مرکز دارای NICU اعزام گردد

دکتر ظفربخش - فلوشیپ اختلالات کف لگن